



МИНЗДРАВ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)
Воровского ул., 64, Челябинск, Россия, 454092
Тел.: (351) 232-73-71, Факс: (351) 232-74-82
www.chelsma.ru kanc@chelsma.ru

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Аветисян Виктории Юрьевны на тему:
«Сравнительная эффективность разных методов реперфузии у больных старческого возраста при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология.

Для достижения реперфузии инфаркт-связанной коронарной артерии при остром инфаркте миокарда используются методы тромболитической терапии, первичного чрескожного вмешательства и их сочетания в виде фармакоинвазивной стратегии. Основные принципы лечения больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, в том числе и выбор метода коронарной реперфузии, сформулированы в современных национальных и международных рекомендациях. Однако у пациентов старческого возраста доказательная база этих рекомендаций значительно меньше, чем у более молодых пациентов, а их практическая реализация является затруднительной. На сегодняшний день выбор оптимального метода лечения больных старческого возраста с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в реальной клинической практике остается дискуссионным. Поэтому проблема, которой посвящена диссертация Аветисян В.Ю. – сравнение эффективности разных методов реперфузии у больных ≥ 75 лет с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST – является актуальной и с научной и с практической точки зрения.

В работе выполнен сравнительный анализ эффективности и безопасности разных методов коронарной реперфузии: тромболитической

терапии, первичного чрескожного вмешательства и фармакоинвазивной стратегии у пациентов старческого возраста.

Основной научной новизной исследования является установление пользы выполнения рутинного стентирования инфаркт-связанной коронарной артерии после проведенного тромболизиса с косвенными признаками коронарной реперфузии у стабильных пациентов ≥ 75 лет. Несмотря на возраст и опасность осложнений этой инвазивной процедуры, польза от ее проведения превышает возможный риск осложнений. Преимущество инвазивной стратегии проявляется в течение года наблюдения в виде уменьшения частоты комбинированной конечной точки смерть+рецидив инфаркта миокарда. Статистически значимой пользы отсроченного стентирования за госпитальный период наблюдения обнаружить не удалось, вероятно, из-за недостаточного объема наблюдений.

Кроме этого, впервые обнаружена недостаточная чувствительность стандартных косвенных признаков реперфузии миокарда – уменьшение подъема сегмента ST $\geq 50\%$ в информативных отведениях через 90 минут после тромболизиса, так как в большинстве случаев при этом у пациентов старческого возраста сохраняется окклюзия инфаркт-связанной коронарной артерии. Эта находка ставит вопрос о необходимости разработки новых критериев диагностики коронарной реперфузии после тромболизиса у пациентов старческого возраста.

Методический уровень работы высокий. Критерии включения пациентов в исследование четко сформулированы, дизайн его проведения хорошо продуман. Значительный объем клинического материала, высокая информативность использованных специальных методов исследования и методов статистической обработки полученных данных, обеспечили высокую достоверность сформулированных в работе выводов и научных положений. На основании проделанной работы автором сформулированы практические рекомендации, которые являются полезными для практического здравоохранения.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 8 научных работах (в том числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК) и неоднократно обсуждались на всероссийских и международных конференциях. Замечаний принципиального характера к работе нет.

Заключение. Таким образом, на основании изложенного считаю, что диссертационная работа Аветисян В.Ю. «Сравнительная эффективность разных методов реперфузии у больных старческого возраста при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST», представленная на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология, является законченным научно-квалифицированным трудом, в котором содержится решение актуальной проблемы отечественного здравоохранения, имеющей важное значение для кардиологии. По своей актуальности, новизне, теоретической и практической значимости работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №335; от 02.08.2016 г. №748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология, медицинские науки.

Зав. каф. пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный кардиолог Управления здравоохранения г. Челябинска, доктор медицинских наук, профессор *Ш* Шапошник Игорь Иосифович



Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 16, терапевтический корпус (корпус 10) Челябинской городской клинической больницы №1, 6-й этаж (кабинеты завкафедрой и доцента), а также корпус №1 (неврология и гинекология), 3-й этаж (кабинет доцента).

E-mail: dmitrchel@mail.ru

Тел. 89088235120 (Игорь Иосифович)